Janitan lainta <mark>arlam tan laintan laintan lai</mark>

Balsamina

Vass3R01s151-155

SINGA Collection Vassal-Montpellier

Baldamina : Syrah 1-31A5







5150 .28 DESIGNATION Balsamina = Syrah CLOS 1 PLANCHE 31 RANG A souche 5 Vigueur : 3 PORT : érig - & érig - couché Pédoncule : (L / M - C Millerandage : () Date de Véraison: 7873. Date de Maturité: 24.8.73 x + 2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 14 413 disc. - sph. ell ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 4 avec pépins - apyrène s3 1 s4 3 JUS : inc. - coloré sX

> DESIGNATION: Balsamina = Syrah CLOS A PLANCHE 31 RANG A Souche & Vigueur: 3 PORT : érig - érig - couché Nillerandage : O Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 4.9.75 x+3 Pourriture : 0,5 GRAPPE : (G) - (H) - P : L - (H) - (G) BAIE : TG - G (M) P 17 X 15 disc. - Sph. ell e- ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 8 s3 3 s4 2 avec pépins - apyrène JUS : inc.) - coloré

DESIGNATION Baldamina = Syrah CLOS / PLANCHE 3/ RANG A Souche Vigueur: 3 PORT : éris - ½ éris - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0 Date de Véraison : Date de maturité : 4-9-74 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P - : L - M - C BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s2 1 s32 avec pépins - apyrène s4 2 JUS inc./ - coloré

	! Nombre ! ! Total !		- not the Max too and too a	DATES			
	d'yeux!!	27-3	1.4				
1	2 !	0	0				
2 &							
3	2	0	2 x				
4	2	2 -	2 1	De 1-4-7-4x			
5	!			+12!			

	! Nombre ! Total	!		DATES		
		21.3	: 24.3		!	
1	! 3	1	! 2 - !		!!!!	
2	:4	1	12-			
3	14	1	2-		+11	
4) 0	1			ne	26-3-75+	
5/8	1		!!!	Ure		

Année:
Emplacement ... 1 - 3.1 A.5 Balsamma = Syrah.
Désignation /... Désignation /...

	! Nombre ! Total	!	DATES						
	! d'yer	122 -3	253	29-3	! 2.4	17.4			
1	: 8	! 0	! 0	! e	! 2	! 5 * !			
2	4	13 >	1 3 ×	3 ×	4	4 x			
3	9	2 ×	13 .	4 *	4	14 4			
4	2	: 0	! 0	. 0	0	1 0 1			
5	! 2	:0	! 0	! 0	! 0	! 1 !			

0 6 7.4.46

+22

ANNEE: 1994

EMPLACEMENT 1 3/ A5

3 R1 A 151 155

0	750.	28				o har	4701	,,,,			
Souche	Whre	Débourremen début mi/de	t libre b grap		Flo: début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturito
1			3 6		22.5	24.5	26.5			1	
2			0			, 1					
3			6	Grappe	: G	M - P	Dim		Compac		: L - N-
ą			5	Pour :		Mil	1:		Compac	16	. 11 - 11-
5			7	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TC - disc-sp		-	The order of the last of the l	l-fus		
					<u>r</u> : B-0					- col	oré
				Saveur	: s	m - a:	r - fo	ox - he	erb		
				Pépins	: avec	- ap	yrène				
		,		Port:			Vi	gueur	:		

Désignation: Balsamina = syrah

Emplacement: 1.31 A 51-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation: Balsanina = Syrah Emplacement: 1-31A5 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 4 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

No ordre

Balsamina = Ayrah

Désignation :

1.31 A5

VASSAL

Planche côté Nº

Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5) 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

; ccloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Désignation: Baldamina = Syrah

Emplacement: 4.31A5A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ()- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Balsamina = Syrah Nº d'ordre 1-31A5 Désignation côté Nº souche planche VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 / long 9. 25 - A pédoncule herbacé (I)- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoide 0 - sphéroide I - ellipsoide 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (T)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse)(I)- difficile 2.

Calvo 74

DEMONIHATION / EHPLACHEMY /

Balsamina - Syrah 1-31A54-1

SARMENT_DE_VIGNE

: long (0, moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifie (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds cms : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (6):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (6);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

Emplacement: depl 31 A 5 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 3 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 0 - 2 - 32 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents: S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L²₃ \sqrt{V} - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3.

: (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Forme

Nº d'ordre: 0150,28 Désignation: Balsamina

Origine :

= Syrah

Domergne 81

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2015

Observateur:

CodeVar: 150

CodeIntro: 150Mtp28 Nom Var: Syrah

Emplacement: Vass1R05sP31A

P	ш	T	N	0	1	0	CI	TE
1	11	Ŀ	13	U		U	G I	8 27

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botr	is grappe	très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée	
----------------------------------	-----------	--------------------------	---------	--------------------------	--

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1				1	
2					
3	4	3/13	2/4	3	
4	6	-27/3	31/3	6	
5	6	100/ 21/3 / Adil 27/	30/3	4	
Moyenne	16	22/3	31/3 +3	13	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
215	26/5+2		18/07	23/07+1	24/08 +2	

20/07 DV un per avourée.

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/08	17/08	24/08	
IR	17,50	17,6 17,4	t. ligh	
Valeur papier PH		this light		7

Remarque:

Formulaire de description 1 / 8 (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur:

CodeVar: 150

CodeIntro: 150Mtp28 Nom Var : Syrah

Emplacement: Vass1R05sP31A

	PF	HENOLOGIE				
Code	Descripteur	1	3	5	- 7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Taible tres elev	Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
------------------	---	--------------------------	---------	--	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 16/3	Fertilité (grappes/10 yeux)
1		1	1		
2					1
3	3	190ml 21/3	25/3	4	
4	10	3513	3db + 2001 a 19/3 LNG	a 216 At 2 apriles , 5/4: 6	46
5	1	gonf 11/3	25/3	2	
Moyenne	14		28/3 +4	13	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06-06 +1		31/07	06/08+2	1,001 FL	

SUIVI DE MATURITE Dates 02.09 06.09 IR 2F, PAP, 75 20.05 18,5 Valeur papier PH

Remarque:

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2012

Observateur:

Code introduction: 150Mtp28 Nom introduction: Syrah

rognage, ou maturité)

Emplacement: Vass1R05sP31A

PHENOLOGIE										
Code	Descripteur	1	3	5	7	9				
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 302	époque de floraison	très précoce		Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn	tardive	très tardive				
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e tardive	tardive	très tardive				
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr	Rouge	Rouge	rouge				

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) Faible très faible. Moyenne Très forte Forte croissance prompts-bourgeons (avant Absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte

très faible. RESISTANCE

très faible ou Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe élevée ou moyenne faible très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)	
1						
2						
3	3		22/3	2		
4	м	25/3	50,1013 1/3	+		
5	8		25/3	12		
Moyenne	21		2613-2	21	10	

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	26:05-3		19-07	26.070	27.08	

			SUIVI	SUIVI DE MATURITE			+2,		
Dates	21.08	27.08							
IR .	18-19-12 enione A	20-21,6-							
Valeur papier PH		poodA.	4						
	- + + 1	1 . 1			The same of the sa				

Remarque: 18.07 = Tout DV. 2 bois veires.

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2011

Observateur:

Cépage : Syrah

Code introduction: 150Mtp28

Nom introduction: Balsamina

Emplacement: Vass1R05sP31A

PHENOLOGIE										
Code	Descripteur	1	3	5	7	9				
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	précoce Moyenn		très tardive				
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet				

	Vigu	JEUR ET CROISS	SANCE			
	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
		RESISTANCE			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Zak.

	The state of the s			No. of the last of
Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

	Souche Nombre de bourgeons		Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	1		1		
	2		1	. 14		
	3	2		24/3	1	
	4	. 10	31/3,000	3/4	8	
	5	6		31/3	6	
The state of	Moyenne	18		. 30/3 (13)	15	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15 05	19:05 to		11-60-51	25-07+2	8-09-M+3	

Dates 18-05-11 26-08 31.08 8-09-11 IR 14,6-19, 19,8. 20-16,2-184 Do, 4. Valeur papier encore) PH

Remarque: Ni Rian & 30 06.